Supplemental Table 5: Crude associations between sub-types of LUTS and the social participation component of JST-IC

Sub-types of LUTS		JST-IC (social participation)					
		Total	p	Males	*p*	Females	p
Frequency	No	1.9±1.5	0.27	1.9±1.5	0.58	1.8±1.4	0.29
	Yes	1.7±1.4		1.8±1.5		1.6±1.4	
Nocturia (Once or more)	No	2.0±1.5	0.10	2.0±1.6	0.40	1.9±1.4	0.07
	Yes	1.7±1.4		1.8±1.5		1.6±1.4	
Nocturia (Twice or more)	No	1.8±1.4	0.29	1.9±1.5	0.29	1.7±1.4	0.29
	Yes	1.7±1.4		1.8±1.5		1.6±1.4	
Nocturia (Three times or more)	No	1.8±1.4	**<0.01**	2.0±1.5	**<0.01**	1.7±1.4	0.14
	Yes	1.5±1.4		1.5±1.4		1.4±1.3	
Urgency	No	1.8±1.4	0.12	1.9±1.5	0.40	1.7±1.4	0.11
	Yes	1.6±1.5		1.7±1.6		1.4±1.4	
Urinary incontinence	No	1.8±1.4	0.29	1.9±1.5	0.13	1.7±1.4	0.95
	Yes	1.6±1.5		1.3±1.3		1.7±1.5	
OAB	No	1.8±1.4	0.24	1.9±1.5	0.69	1.7±1.4	0.06
	Yes	1.6±1.5		1.8±1.6		1.3±1.4	

LUTS: lower urinary tract symptom.

JST-IC: Japan Science and Technology Agency Index of Competence.

Student's t-tests were performed.